

POSSÍVEIS CONDUTAS DO PROFISSIONAL FARMACÊUTICO
INTERVENÇÕES PARA RESOLVER PRM
Início de novo medicamento
Suspensão de medicamento
Substituição de medicamento
Alteração de forma farmacêutica
Alteração de via de administração
Alteração na frequência ou horário sem alteração da dose diária
Aumento da dose diária
Redução de dose diária
Fornecer lembrete com horários dos medicamentos
Remover barreiras do paciente para adesão ao tratamento
Recomendação de monitoramento não laboratorial
Recomendação de auto monitoramento (com ou sem fornecimento de diário e/ou disposto)
Outro
OUTRAS INTERVENÇÕES
Informação e aconselhamento
Aconselhamento ao paciente/cuidador sobre um tratamento específico
Aconselhamento ao paciente/cuidador sobre os tratamentos de forma geral
Aconselhamento ao paciente/cuidador sobre medidas não farmacológicas
Aconselhamento ao paciente/cuidador sobre condição de saúde específica
Outro aconselhamento não especificado
Monitoramento
Recomendação de exame laboratorial/monitoramento não laboratorial
Recomendação de auto monitoramento
Outras recomendações de monitoramento não especificadas
Encaminhamento
Encaminhamento a outro serviço farmacêutico
Encaminhamento ao médico (com outros objetivos que não alterar a farmacoterapia)
Encaminhamento ao psicólogo
Encaminhamento ao nutricionista
Encaminhamento a serviço de suporte social
Encaminhamento ao pronto-atendimento
Outros encaminhamentos não especificados

SITUAÇÃO CLÍNICA E FARMACOTERAPÊUTICA	
INICIAL	Objetivos estabelecidos. Iniciar nova farmacoterapia.
RESOLVIDO	Objetivos alcançados, tratamento concluído. Para doenças agudas.
ESTÁVEL	Objetivos alcançados, manutenção do tratamento. Para doenças crônicas.
MELHORA	O PROGRESSO está sendo EVIDENCIADO , deve-se MANTER a mesma farmacoterapia (tempo insuficiente para alcançar objetivos terapêuticos)
MELHORA PARCIAL	O PROGRESSO está sendo EVIDENCIADO , mas é necessário ALTERAR o tratamento para alcançar os objetivos terapêuticos
SEM MELHORA	NENHUM PROGRESSO foi evidenciado até o momento, mas deve-se MANTER a mesma farmacoterapia para tentar obter um efeito melhor (tempo insuficiente para alcançar objetivos terapêuticos)
PIORA	PIORA da saúde enquanto recebia a farmacoterapia; é necessário ALTERAR a opção farmacológica ou a dose para alcançar os objetivos terapêuticos
FALHA	OBJETIVOS NÃO ALCANÇADOS apesar do uso de doses adequadas e pelo tempo adequado. Necessário retirar o medicamento e iniciar outro
MORTE	Paciente faleceu durante o tratamento