

Oxiurose



Oxiurose




- Infecção causada por *Enterobius vermicularis*
- Vermes nematódeos - menos de 1 cm de comprimento
- Mais comum em **crianças (auto-infecção)**

Oxiurose

- **Patogenia**
 - Reação inflamatória discreta da região cecal
- **Sintomas**
 - Maioria assintomática
 - Prurido anal (coceira) – predominantemente noturna
 - Distúrbios do sono
 - Vulvovaginites nas meninas
 - Náuseas e vômitos
 - Dores abdominais e intestinais

} Infecção avançada

- Após o acasalamento, as fêmeas grávidas permanecem no ceco e, à noite, se movem através do intestino em direção ao ânus, local onde costumam implantar seus ovos.




- **1. Autoinfecção:** paciente coça a região do ânus - contamina suas mãos e unhas com os ovos - mão contaminada levada à boca
- **2. Retroinfecção:** após 3 semanas, os ovos implantados na região perianal eclodem e dão origem a novos indivíduos que podem entrar pelo ânus e seguir em direção ao ceco, onde irão se acasalar novamente.
- **3. Heteroinfecção:** transmissão para outras pessoas. mãos sujas ou roupas de cama e banho.
- Ovos: inviáveis após **1 ou 2 dias** sob condições quentes e secas

■ Diagnóstico

■ Como a eliminação do *E. vermicularis* pelas fezes pode ser errática, o exame parasitológico de fezes comum não costuma ser positivo.

■ Método de fita adesiva na pele ao redor do ânus para que os ovos localizados nesta região fiquem aderidos à fita. Estes ovos, então, são colocados sobre uma lâmina de vidro e visualizados sob um microscópio.

■ Material colhido da unha de crianças infectadas também pode ser útil para avaliação microscópica, pois frequentemente contém ovos



■ Prevenção

- Higiene adequada das mãos
- Não compartilhar roupas íntimas
- Brinquedos devem ser lavados
- Manter as unhas cortadas
- Troca de roupas de cama e banho
- Cuidados na arrumação do leito no ambiente hospitalar



Tratamento

- Simples e deve ser feito preferencialmente em todas as pessoas que moram na mesma casa.
- Mebendazol – dose única de 100 mg
- Albendazol
- Pamoato de pirvínio
- Taxa de cura elevada, acima de 95%. Entretanto, se as pessoas que moram na mesma casa não forem também tratadas, o risco de reinfecção é alto.

