

CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO (2017)

IDADE	VACINAS	LOCAL DE APLICAÇÃO
NASCIMENTO	BCG e HEPATITE B ¹	BCG: intradérmica no braço direito Hep B: no vasto lateral da coxa direito
2 MESES	PENTAVALENTE (DTP/Hib/Hep. B) VIP ² ROTAVÍRUS ³ PNEUMO 10 VALENTE ⁴	Penta: vasto lateral da coxa esquerdo VIP: vasto lateral da coxa direito Rotavírus: oral Pneumo 10: vasto lateral da coxa direito
3 MESES	MENINGO C ⁵	Meningo C: vasto lateral da coxa esquerdo
4 MESES	PENTAVALENTE (DTP/Hib/Hep. B) VIP ² ROTAVÍRUS ³ PNEUMO 10 VALENTE ⁴	Penta: vasto lateral da coxa esquerdo VIP: vasto lateral da coxa direito Rotavírus: oral Pneumo 10: vasto lateral da coxa direito
5 MESES	MENINGO C ⁵	Meningo C: vasto lateral da coxa esquerdo
6 MESES	VIP ² PENTAVALENTE (DTP/Hib/Hep.B)	VIP: vasto lateral da coxa direito Penta: vasto lateral da coxa esquerdo
9 MESES	FEBRE AMARELA (FA) ⁶	SC
12 MESES	SARAMPO-CAXUMBA-RUBÉOLA (SCR) ⁷ MENINGO C ⁵ PNEUMO 10 VALENTE ⁴	SC Meningo C: vasto lateral da coxa esquerdo Pneumo 10: vasto lateral da coxa direito
15 MESES	DTP VACINA ORAL CONTRA POLIOMIELITE (VOP) HEPATITE A ⁸ SARAMPO-CAXUMBA-RUBÉOLA-VARICELA (TETRAVIRAL)	DTP: vasto lateral da coxa esquerdo VOP: oral Hepatite A: vasto lateral da coxa direito TETRAVIRAL: SC
4 ANOS	DTP VACINA ORAL CONTRA POLIOMIELITE (VOP) FEBRE AMARELA (FA) ⁶	DTP: deltóide esquerdo VOP: oral FEBRE AMARELA: SC
9 ANOS	HPV ⁹	IM
12 – 13 ANOS	MENINGO C ⁵	IM
15 ANOS	DUPLA ADULTO (dT) ¹⁰	deltóide esquerdo
Após aborto imediato (se calendário vacinal desatualizado)	DUPLA ADULTO (dT) ¹⁰ SARAMPO-CAXUMBA-RUBÉOLA (SCR) ⁷ HEPATITE B ¹ FEBRE AMARELA ⁶ (após 15 dias da vacina SCR)	dupla adulto: deltóide esquerdo SCR : SC do braço direito hepatite B: deltóide direito FA: SC do braço esquerdo
Após o parto (se calendário vacinal desatualizado)	DUPLA ADULTO (dT) ¹⁰ SARAMPO-CAXUMBA-RUBÉOLA (SCR) ⁷ HEPATITE B ¹	dupla adulto: deltóide esquerdo SCR : SC do braço direito hepatite B: deltóide direito
60 anos e + Acamados /asilados Crianças entre 6 m e menores de 5 anos Trabalhadores da saúde Gestantes Doentes crônicos Puérperas	Acima de dois anos de idade INFLUENZA SAZONAL ¹¹ Abaixo de dois anos de idade INFLUENZA SAZONAL ¹¹	deltóide direito vasto lateral da coxa direito

1. Hepatite B:

- Deve ser aplicada nas primeiras doze horas de vida do RN, na maternidade pública ou privada;
- A partir de agosto de 2012, com a introdução da vacina Pentavalente, criança recebe, além da primeira dose da vacina contra a Hepatite, mais três doses aos 2, 4, 6 meses (pois a vacina contra Hepatite B é parte da vacina Pentavalente).
- O intervalo mínimo entre a 1ª e a 2ª dose é de 30 (trinta) dias;

- O intervalo entre a 2ª e a 3ª dose é de dois meses (60 dias) desde que o intervalo de tempo decorrido entre a primeira e a terceira dose, seja no mínimo, de quatro meses e a criança já tenha completado 6 meses de idade;

2. VIP

- Vacina injetável contra poliomielite

3. Rotavírus:

- Idade máxima para primeira dose é de 3 meses e 15 dias.

- Idade máxima para segunda dose é de 7 meses e 29 dias.

Obs: Criança que não recebeu a 1ª dose até 3 meses e 15 dias não poderá mais ser vacinada. Criança que recebeu a 1ª dose em clínica particular, não deverá receber a 2ª dose da rede pública (vacinas diferentes não intercambiáveis)

4. Pneumocócica 10 valente:

- Está indicada para crianças entre 2 meses e 4 anos.

- Intervalo mínimo entre a primeira e a segunda dose de 30 dias e intervalo entre a segunda dose e o reforço: 60 dias.

- Idade máxima: 4 anos, 11 meses, 29 dias

5. Meningocócica C:

- A vacina está indicada para crianças entre 2 meses e 4 anos.

- Intervalo mínimo entre a primeira e a segunda dose de 30 dias e intervalo entre a segunda dose e o reforço: 60 dias.

6. Febre Amarela (FA):

- Não aplicar a vacina FA no mesmo dia da SCR ou Tetraviral, aguardar intervalo de 30 dias.

7. SCR (Tríplice Viral):

- Adolescentes até 19 anos, 11 meses, 29 dias deverão receber 2 doses SCR (intervalo mínimo: 30 dias)

8. Hepatite A:

- Idade máxima: 23 meses

9. HPV:

- Primeira visita: 1ª dose; Segunda dose: 6 meses após a primeira

- Meninas: Iniciar o esquema até 14 anos e 5 meses

- Meninos: Iniciar o esquema até 13 anos, 11 meses e 29 dias

- Pessoas portadoras de HIV: Iniciar esquema até 26 anos, 11 meses e 29 dias

10. Dupla Adulto (dT):

- Reforço a cada 10 anos, por toda a vida. Em caso de gravidez e na profilaxia do tétano após alguns tipos de ferimentos, deve-se reduzir este intervalo para cinco anos.

- Intervalo mínimo entre as doses é de 30 dias.

11. OBSERVAÇÃO:

- Nos meses de março/abril/maio habitualmente começa a aplicação da vacina influenza sazonal para crianças entre 6 meses e menores de 5 anos de idade, além das pessoas com 60 anos ou mais. Ao receber a vacina pela 1ª vez nesta idade, a criança deve receber uma dose de reforço com intervalo de 30 dias entre elas;

- Até 3 anos de idade a criança deve receber a metade da dose (0,25 ml – IM);

- Acima de três anos a dose é 0,5 ml e acima de 9 anos é dose única, mesmo na primo

vacinação.