

Dados epidemiológicos anuais

- 12 milhões de crimes sexuais em todo o mundo 1
- 683 mil estupros nos EUA²
- 200 mil casos de abuso sexual contra crianças ns EUA
- 42 mil estupros em São Paulo '

1368 crimes sexuais em todo o mundo



- 78 estupros nos EUA
- 23 casos de abuso sexual contra crianças nos EUA
- 4 estupros em São Paulo



Violência Sexual & Gravidez Forçada


Bósnia-Herzegovina

Croácia

Libéria

lugoslávia

Prevalência de Violência Contra a Mulher Cometida pelo Parceiro em Diferentes Países







Violência Contra a Mulher Durante a Gravidez

20 a 25% das mulheres sofrem violência durante a gravidez CONVINGTON DL et al. *J Reprod Med 46, 2001*

2 a 17% das gestantes sofrem abuso sexual

SHANE B & ELLSBERG M. Outlook 20, 2002

8% das adolescentes grávidas sofrem violência sexual

SATIN AJ et al. J Obstet Gynecol 167, 1992

Violência persiste para 25% das mulheres até 6 meses do parto

SATIN AJ et al. J Obstet Gynecol 167, 1992

Prevalência maior que pré-eclampsia, diabete ou placenta prévia

JOHNSON JK et al. BJOG 110, 2003



Violência Contra a Mulher Durante a Gestação

Agravo da violência em 13% dos casos

A gravidez e o puerpério não oferecem proteção para a mulher

Vulnerabilidade maior se a gravidez é indesejada ou inoportuna

Riscos e impactos para a mulher, gravidez e concepto

Violência Sexual e Gestação

- Gravidez indesejada
- Postergar início do PN ou realizar menor número de consultas
- Ganho de peso insuficiente
- Parto prematuro, prematuridade e baixo peso ao nascer
- Infecções genitais e do trato urinário
- Aborto e morte fetal

MARTIN SL et al. *Int J Gynecol Obstet 79, 2002*BUESCHER PA & MORACCO KE. *JAMA 285, 2001*RACHANA C et al. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 103, 2002*



Efeitos emocionais

Depressão

Angústia

Baixa auto-estima

Isolamento social

Tentativa e idéias suicidas persistentes

Uso abusivo de drogas, álcool e cigarro

ARCOS EG et al. Rev Med Chile 129, 2001 MUTHAL-RATHORE A et al. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 76, 2002



Fatores de morbidade, mortalidade e impacto para a saúde sexual e reprodutiva

Traumatismos genitais e extragenitais

Infecções Sexualmente Transmissíveis e HIV/aids

Gravidez decorrente da violência sexual

Síndrome da Desordem Pós Traumática (SDPT)





Fatores de risco para as DST, Hepatites e HIV



Doenças Sexualmente Transmissíveis

Incidência e prevalência elevadas (28% a 60%)

JENNY C et al. - N. Engl. J. Med., 322, 1990

Risco de infecção pelo HIV entre 0,8 e 2,7%

DREZETT et al. - *RBGO, 1999*JENNY C et al. - *N. Engl. J. Med., 322, 1990*

Risco duas vezes maior entre gestantes

SATIN AJ et al. - Am. J. Obstet. Gynecol., 167, 1992

Agravos devido a baixa adesão aos cuidados

GLASER JB et al. - J. Infect. Dis., 164, 1989

Impacto sobre a saúde sexual, reprodutiva e mental

BEEBE DK - J. Miss. State Assoc., 39, 1998



Profilaxia da Hepatite B

Imunização passiva

Imunoglobulina humana anti-hepatite B

0,06 a 0,08 ml / Kg / IM, dose única até 14 dias da violência sexual

Imunização ativa

Vacina anti-hepatite B

1,0 ml, IM (deltóide) admissão, 1 e 6 meses da violência sexual

Profilaxia das Doenças Sexualmente Transmissíveis Não Virais

Profilaxia das DST não virais em gestantes

Penicilina Benzatina

2.400.000 UI IM dose única

Ceftriaxona

+

125 a 250 mg IM dose única

Azitromicina


+

1 g VO dose única

Metronidazol




2 g VO dose única



Replicação do HIV

Locais de ação dos diferentes grupos de antiretrovirais em casos de profilaxia pós exposição



Infecção pelo HIV e carga viral

Redução da carga viral esquemas antiretrovirais

plasmática com diferentes esquemas antiretrovirais







Quimioprofilaxia para a infecção pelo HIV após violência sexual em mulheres adultas

Zidovudine

300 mg VO pela manhã e 300 mg VO no jantar

Lamivudine


150 mg VO pela manhã e 150 mg VO no jantar

Indinavir

800 mg VO cada 8 horas

Violência sexual e HIV

Adesão a profilaxia antiretroviral pós exposição em violência sexual



Quimioprofilaxia antiretroviral para o HIV

Resultados do estudo multicêntrico - São Paulo

SOROCO	NVERSAO
SIM	NÃO

	SIM		NÃO			
Grupos	n	%	n	%	TOTAL	
Grupo de estudo (com quimioprofilaxia)	0	0 *	182	100	182	
Grupo controle (sem quimioprofilaxia)	4	2,7 *	141	97,3	145	

Prova Exata de Fisher: p = 0.037771




Acompanhamento Laboratorial das DST/Hepatites/HIV

exame complementar	admissão	6 semanas	3 meses	6 meses
HIV 1 e 2				
Hepatite B				
Hepatite C				
Sífilis				
Conteúdo Vaginal				
Colposcopia e DNA-HPV				

Aconselhamento







Aborto Previsto por Lei

Artigo 128 do Código Penal Brasileiro

Aborto necessário: risco de morte para a gestante

Aborto sentimental: gravidez decorrente da violência sexual

