



# Pneumonia Adquirida na Comunidade (PAC)

Valdes Roberto Bollela

Divisão de Moléstias Infecciosas

Departamento de Clínica Médica da FMRP-USP

# Caso Clínico 1

RGB de 34 anos, sem doença prévia conhecida, procurou a o Centro de Saúde Escola da Cuiabá porque está apresentando febre diária, de até 39°C, há 5 dias.

Paciente refere que há 5 dias tem tido tosse, de início seca e agora com expectoração amarelada. Refere falta de ar leve a moderada aos esforços e indisposição geral.

## **Ao exame físico:**

Bom estado geral, conciente, orientado e eupneico (FR= 18ipm)

Temp= 38,6°C. PA: 126x72 mmHg. FC= 96 bpm.

À ausculta torácica revelou estertores crepitantes em campo inferior direito e egofoni a na mesma região.

Sem outras alterações.

# Raio X



# Caso Clínico 1

- **Em relação ao caso pergunta-se:**
  - Qual é a principal hipótese diagnóstica para este caso?
  - Quais são os agentes etiológicos mais importantes, relacionados a este tipo de quadro?
  - Como eu poderia fazer o diagnóstico etiológico desta infecção?
  - Cite dois antibióticos que estriam indicados para esse caso.
  - Se o paciente fosse idoso (75 anos) e estivesse em regular a mau estado geral necessitando de internação hospitalar, quais exames complementares você solicitaria?

# Receita

**Modelo de Receita com opções de ATB. Diretrizes PAC 2009.**

## Receituário

**Para :** Nome do paciente

**Uso interno (ou Uso oral):**

•Amoxicilina: Tomar 1 comprimido por via oral de 8/8 horas por 7 dias	500 mg	21 cps
•Azitromicina: Tomar 1 cp por via oral em dose única diária, por 3 dias	500 mg	03 cps
•Azitromicina Tomar 500 mg no primeiro dia, seguido de 250 mg por dia por 4 dias	250 mg	06 cps
•Claritromicina de liberação rápida Tomar 1 cp por via oral de 12/12 horas por 7 dias	500 mg	14 cps
•Claritromicina (liberação prolongada): Tomar 1 comprimido por via oral, por dia por 7 dias.	UD 500 mg	07 cps

**Assinatura (nome legível):** \_\_\_\_\_

**Data:** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Lembrar também dos antitérmicos:**

**Dipirona: 500mg até 6/6 horas se febre**

**Paracetamol: 500 mg até 6/6 horas ou 750 mg até 8/8 horas se febre**

**OBRIGADO**