


# SINAIS DE ALERTA EM CEFALEIA



Profa. Dra. Fabíola Dach

Ambulatórios de Cefaleia na infância e adolescência  
(ACEI), Cefaleia no adulto (ACEF) e Dor Neuropática  
(DNPT)

# Sinais de alerta



A cefaleia pode fazer parte do cortejo sintomatológico de uma doença qualquer, seja do SNC ou sistêmica.

# Sinais de alerta

Anamnese	Alertas
Idade	< 10 anos e > 50 anos
Instalação e evolução	Primeira cefaleia Mudança no padrão da cefaleia Início súbito e/ou recente Desencadeadas pelo esforço físico Progressiva Piora com a postura
Intensidade	A pior cefaleia

# Sinais de alerta

Anamnese

Alertas

Sintomas associados

Febre

Náuseas e/ou vômitos

Sintomas neurológicos focais

Distúrbios da consciência

Descarga nasal purulenta

Queixas visuais

---

Antecedentes

Câncer, SIDA, trauma, glaucoma,  
outras doenças sistêmicas

# Sinais de alerta

Exame físico

Alertas

PA

Elevação súbita

---

Temperatura

Febre

---

Palpação do crânio

Pontos dolorosos

---

# Sinais de alerta

Exame neurológico

Alertas

Consciência

Alteração

Nervos cranianos

Edema de papila

Distúrbios da motricidade  
ocular

Anisocoria

Paralisia facial

# Sinais de alerta

Exame neurológico

Alertas

Motricidade

Sensibilidade

Sinais focais

Coordenação

Reflexos

Assimetria, Babinski

Brudzinski, Lasègue, Kernig,  
mobilidade pescoço

Irritação meníngea

# Abordagem do paciente

## Paciente com cefaleia aguda

