

OITAVA LISTA DE EXERCÍCIOS

Resolva por Indução os exercícios 1 a 8

(1) $\left(\frac{n+1}{n}\right)^n \leq n$, para todo $n \geq 3$.

(2) $1^3 + 2^3 + 3^3 \cdots + n^3 = \frac{1}{4}n^2(n+1)^2$, para todo $n \geq 1$.

(3) $(1 + 2 + \cdots + n)^2 = 1^3 + 2^3 + 3^3 \cdots + n^3$, para todo $n \geq 1$.

(4) $1 \cdot 1! + 2 \cdot 2! + 3 \cdot 3! + \cdots + n \cdot n! = (n+1)! - 1$, para todo $n \geq 1$.

(5) (Desigualdade de Bernoulli) $(1 + \alpha)^n \geq 1 + \alpha n$ ($\alpha \in \mathbb{R}$, $\alpha > -1$), para todo $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$.

(6) $\frac{4^n - 1}{3}$ é inteiro e ímpar, para todo $n \geq 1$.

(7) $|\sin(nx)| \leq n|\sin x|$, para todo $n \geq 1$, para todo $x \in \mathbb{R}$.

(8) A soma dos ângulos internos de um polígono convexo e n lados é $(n-2)180^\circ$.

(9) Considere a seguinte sequência de números dada recursivamente: $a_0 = 1$ e $a_n = 2a_{n-1} + 1$, para $n \geq 1$.

(a) Exiba os 5 primeiros termos da sequência (a_n) ,

(b) Prove que $a_n = 2^{n+1} - 1$, para todo $n \geq 1$.

(10) Considere a seguinte sequência de números dada recursivamente: $b_0 = 1$ e $b_n = 3b_{n-1} - 1$, para $n \geq 1$.

(a) Exiba os 5 primeiros termos da sequência (b_n) ,

(b) Encontre uma fórmula para b_n que dependa somente de n .

(11) Descubra a lei sugerida pelos fatos apresentados e prove-a por indução:

$$\frac{1}{2!} = \frac{1}{2}, \quad \frac{1}{2!} + \frac{2}{3!} = \frac{5}{6}, \quad \frac{1}{2!} + \frac{2}{3!} + \frac{3}{4!} = \frac{23}{24}, \dots$$

(12) No desenvolvimento de $\left(x + \frac{1}{x^2}\right)^{12}$, qual é o valor do coeficiente do termo independente de x ?

(13) Qual é o coeficiente de x^7 na expansão de $(\sqrt{x} + \sqrt[3]{x})^{15}$?

(14) Simplifique

(a) $\frac{(n+3)! - (n+1)!}{(n+2)!}$ (b) $\binom{m-1}{p-2} + \binom{m-1}{p-1} + \binom{m}{p}$ (c) $\sum_{m=1}^p \binom{m}{m-1}$

(15) Resolva as equações

(a) $(n!)^2 = 18(n!) + 144$ (b) $\binom{n-1}{2} = \binom{n+1}{4}$

(16) Mostre que $\binom{n}{m} \cdot \binom{m}{r} = \binom{n}{r} \cdot \binom{n-r}{m-r}$

(17) Se $(\sqrt{3} - 1)^5 = a\sqrt{3} + b$, onde a e b são números inteiros, encontre os valores de a e b .

(18) Determine o conjunto das partes de $A = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$.