

- 1) Paciente do sexo feminino, 50 anos. Sofreu um AVE hemorrágico há 3 meses. Apresenta hemiparesia a direita. Chegou para avaliação fisioterapêutica e sua queixa principal é a dificuldade para andar. Faça um plano de tratamento que utilize corrente excitomotora para treino de marcha.
- 2) Paciente do sexo masculino, 25 anos, jogador de Rugby. Sofreu uma lesão meniscal D durante uma partida e foi submetido a intervenção cirúrgica após 1 mês da lesão. Chegou para fisioterapia no 3º dia de pós-operatório com edema e com evidente hipotrofia do músculo quadríceps D. Monte um tratamento que utilize corrente excitomotora para as próximas 4 semanas.
- 3) Paciente do sexo feminino, 60 anos. Diagnosticada com incontinência urinária de urgência há 2 anos. Não tem indicação para tratamento cirúrgico. Foi encaminhada para a fisioterapia. Monte um protocolo de tratamento que utilize uma corrente excitomotora para melhora do quadro.
- 4) M.B.A, sexo masculino, 18 anos. Sofreu um acidente de moto e está internado na U.T.I com politrauma, sedado e com monitoramento cardíaco. Monte um protocolo de tratamento com corrente excitomotora para manutenção do metabolismo muscular.
- 5) V.J.A, sexo masculino, 37 anos, pedreiro, e após uma queda começou a apresentar dor e incapacidade do membro superior direito. Foi diagnosticado com uma lesão de manguito rotador (supraespinal). Foi submetido ao tratamento cirúrgico após 1 ano de diagnóstico e desde de então está sem trabalhar e com déficit de força e ADM no MSD. Apresenta grande limitação para a abdução do ombro.

Questão:	Grupo:
----------	--------

- Problema:

- Objetivo:

- Meta:

- Ação:

- Indicador: