

1. Paciente, B.F.T, sexo feminino, 25 anos. Rompimento de LCA do MID há 3 meses e se encontra no 1° dia de pós-operatório. Apresenta edema e dor na região anterior e posterior do joelho. \*
2. Paciente, sexo masculino, 70 anos, diabético e neuropata. Sofreu entorse de tornozelo e procurou um fisioterapeuta. Após a primeira sessão só poderá voltar após 5 dias. Qual sua conduta, e como você deve instruir este paciente a agir em sua casa, no que se refere a crioterapia? \*
3. Paciente, T.T.G, sexo feminino, secretária 45 anos, apresenta epicondilite medial e espasmo protetor dos flexores de punho e dedos D por excesso de uso. Qual as orientações domiciliares que você dará a paciente. \*
4. Atleta W.A., sexo masculino, praticante de atletismo (revezamento). Após o término da última prova, relatou cansaço extremo, edema nas pernas, e procurou a fisioterapia imediatamente para amenizar os sinais e sintomas produzidos pelo exercício físico de alta intensidade. \*
4. Paciente, F.J.R, 56 anos, sexo feminino. Sofreu uma queda, caindo em decúbito lateral sobre o ombro esquerdo. Foi levada ao hospital e após RM, foi constatado rompimento do supraespinal. Paciente foi encaminhada para a fisioterapia. \*

**\* Associar com a cinesioterapia**

Questão:	Grupo:
----------	--------

- Problema:

- Objetivo:

- Meta:

- Ação:

- Indicador: