

- 1) Paciente do sexo feminino, 26 anos. Apresenta luxação femuro-patelar do membro inferior direito a pelo menos 2 anos, com recidivas recentes. Após a avaliação fisioterapêutica, observou-se uma hipotrofia do músculo vasto medial. Faça um plano de tratamento que utilize corrente excitomotora e associe, a médio prazo, com exercício funcionais.
- 2) Paciente do sexo feminino, ciclista, 30 anos. Diagnosticada com incontinência urinária de esforço há 1 ano. Foi encaminhada para a fisioterapia. Monte um protocolo de tratamento que utilize uma corrente excitomotora.
- 3) Paciente E.M.L., sexo feminino, após mastectomia da mama esquerda, apresentou linfedema de MSE. Elabore um plano de tratamento, envolvendo a corrente excitomotora, para drenagem de edema, associando a outras técnicas já utilizadas na área.
- 4) Lesão corto-contusa parcial do nervo mediano, com enxerto nervoso a 8 meses. Apresenta contração dos músculos flexores dos dedos, com déficit do movimento de preensão palmar. Os músculos flexores superficial e profundo respondem à corrente excitomotora, com duração de fase de 300 us. Monte um protocolo de tratamento, incluindo a corrente excitomotora para ganho de força e coordenação do punho e dedos.
- 5) Homem de 58 anos com lesão do manguito rotador E, com discinesia escapular. Apresenta déficit dos músculos adutores e rotadores superiores da escápula. Associe a estimulação elétrica neuromuscular ao protocolo de tratamento.

Questão:	Grupo:
----------	--------

- Problema:

- Objetivo:

- Meta:

- Ação:

- Indicador: