

1. Paciente, D.L.K, 28 anos, tenista amador, IMC 22 Kg/m², começou a sentir dor na parte lateral do cotovelo D há 1 semana que estava impossibilitando de jogar. Procurou um médico e foi diagnosticado com epicondilite lateral e encaminhado para a fisioterapia.
2. Paciente C.F.O, 25 anos, IMC 23 Kg/m²pós-graduanda, procurou um fisioterapeuta porque está com dor EVA 8 no ponto gatilho de trapézio D.
3. Paciente F.S.W, 30 anos, IMC 32 Kg/m²estava em um campeonato de futebol amador, ao correr em direção ao gol sofreu uma falta. Começou a sentir dores na panturrilha E, local em que foi atingido. Foi levado pela equipe médica e diagnosticado com contusão muscular. Chegou no ambulatório de fisioterapia no dia seguinte ao ocorrido.
4. Paciente G.H.J, 50 anos, IMC 25 Kg/m², trabalhador rural, procurou a fisioterapia por ter diagnóstico médico de bursite subacromial direita crônica.
5. Paciente F.G., feminino, sedentária, 63 anos, IMC 35 Kg/m², possui artrose do joelho D, com comprometimento (dor e inflamação) do ligamento colateral medial, pata de ganso e do tendão infrapatelar.

Questão:	Grupo:
----------	--------

- Problema:

- Objetivo:

- Meta:

- Ação:

- Indicador: