

V. Determinação da posição a partir da velocidade

1. Determinação da posição de um objeto a partir do gráfico de $v(t)$.

Já vimos que os gráficos de posição e velocidade de um objeto em função do tempo estão relacionados. A velocidade, v , é a taxa de variação da posição pelo tempo, de maneira que quando $x(t)$ é uma função crescente, v é positivo e quando $x(t)$ é decrescente, v é negativo. Quantitativamente, definimos a velocidade como a inclinação da reta tangente ao gráfico de $x(t)$ que corresponde matematicamente à derivada da função e pode ser interpretada como a velocidade média num intervalo de tempo muito pequeno em torno do instante de interesse. Verificamos que é possível obter fórmulas para as derivadas de algumas funções. Enfim, dado $x(t)$, podemos determinar $v(t)$.

Neste texto, vamos lidar com o processo inverso, ou seja, como determinar $x(t)$ a partir de $v(t)$. Veremos que quase podemos mesmo determinar a posição de um objeto a partir de sua velocidade. Acontece que, como a velocidade não está ligada à posição de um corpo, mas sim à **variação** de posição, tudo que podemos obter da velocidade é a **diferença** de posição em relação à localização inicial.

Para facilitar o acompanhamento da discussão, considere o gráfico da Figura 1, que representa a posição de um objeto, x , em função do tempo, t . Podemos dividir o movimento de um objeto em n pequenos deslocamentos sucessivos e, no gráfico da Figura 1 abaixo, consideramos apenas 4 deslocamentos, entre os instantes de t_1 a t_5 marcados no eixo das abscissas; nesses instantes, o objeto está nas posições x_1 a x_5 , conforme o gráfico. Note que precisamos 5 tempos para 4 deslocamentos, porque definimos o deslocamento por meio da relação

$$\Delta x_i = x(t_{i+1}) - x(t_i) \quad ,$$

onde a letra grega Δ (delta maiúsculo) vai ser usada frequentemente nesta disciplina e no curso todo para significar a variação de uma grandeza.

Voltemos a considerar um número n de deslocamentos, $\Delta x_1, \Delta x_2, \dots, \Delta x_i, \dots, \Delta x_n$, que se iniciaram nos instantes de tempo $t_1, t_2, \dots, t_i, \dots, t_n$. Chamando de Δt_i o intervalo de tempo em que ocorreu o deslocamento Δx_i , podemos relacionar os deslocamentos com as velocidades por meio da expressão

$$\Delta x_i \cong v(t_i) \Delta t_i \quad (3)$$

que se constitui numa aproximação boa quando o intervalo de tempo é suficientemente pequeno para que a velocidade seja aproximadamente constante no intervalo.




Figura 1. Gráfico de posição por tempo de um corpo, em que 5 posições (t_i, x_i) estão identificados.

Aplicando a fórmula (3) repetidamente, pode-se montar o seguinte conjunto de equações:

$$\begin{aligned}
 x(t_2) - x(t_1) &\cong v(t_1)\Delta t_1 \\
 x(t_3) - x(t_2) &\cong v(t_2)\Delta t_2 \\
 &: \\
 x(t_{i+1}) - x(t_i) &\cong v(t_i)\Delta t_i \\
 &: \\
 x(t_{n+1}) - x(t_n) &\cong v(t_n)\Delta t_n .
 \end{aligned}$$

Somando todas essas equações, nota-se que, na soma dos membros esquerdos, todas as posições intermediárias entre $x(t_{n+1})$ e $x(t_1)$ cancelam-se, resultando em

$$x(t_{n+1}) - x(t_1) \cong v(t_1)\Delta t_1 + v(t_2)\Delta t_2 + \dots + v(t_i)\Delta t_i + \dots + v(t_n)\Delta t_n$$

ou seja, o deslocamento total do corpo é, simplesmente, a soma dos produtos $v(t_i) \Delta t_i$ ao longo de todo o intervalo de tempo. Em um gráfico de velocidade em função do tempo, esse produto é interpretado

como a “área” de um retângulo, de altura $v(t_i)$ e largura Δt_i .¹ A soma desses retângulos aproxima a “área” sob a curva de $v(t)$, que não pode ser obtida por medidas diretas com a régua porque, além de considerar as escalas do gráfico, quando $v(t)$ é negativo o deslocamento é negativo, de maneira que teremos que *subtrair* a “área” correspondente. Finalmente, veja que não obtivemos a posição do objeto, mas sim $x(t_{n+1}) - x(t_1)$, ou seja, o deslocamento em relação à posição inicial. No fundo isso era esperado, já que a velocidade depende da **variação** de posição, e não da posição, de um objeto.

A expressão acima é representada melhor usando o símbolo de somatório,

$$x(t_{n+1}) - x(t_1) \cong \sum_{i=1}^n v(t_i) \Delta t_i \quad (4)$$

No curso de cálculo será estudado que o limite dessa expressão, quando cada um dos deslocamentos sucessivos tende a zero, pode ser calculado exatamente. Esse valor limite é chamado de integral, sendo simbolizado por um S distorcido, \int . A fórmula fica assim:

$$x(t_{n+1}) - x(t_1) = \int_{t_1}^{t_{n+1}} v(t) dt$$

A integral pode ser determinada por meio de fórmulas analíticas, assim como fizemos com as derivadas. Neste momento, porém, nos concentraremos na interpretação do deslocamento como área sob a curva da velocidade.

2. Exemplos de cálculo do deslocamento a partir da velocidade

Os exemplos a seguir estão enunciados como exercícios, de modo a acostumá-lo com a linguagem típica dos exames, cheia de subentendidos.

Exemplo 1. O motorista de um ônibus no trânsito urbano, parado em um farol, começa a acelerar em $t = 10$ s com aceleração constante e igual a $2,0 \text{ m/s}^2$ até atingir 36 km/h , mantendo essa velocidade por 15 s, quando avista o farol seguinte fechado e começa a frear, com aceleração constante e de módulo $1,0 \text{ m/s}^2$, até parar completamente o veículo.

- Faça um gráfico da velocidade em função do tempo.
- Determine a distância que o veículo percorreu entre as duas paradas.
- Determine o instante em que o veículo se encontrava a 200 m do ponto de partida.

Solução.

(a) Embora o problema fixe a origem do tempo, ele deixa em aberto a origem da medida de posição. Assim, escolhamos a origem na posição inicial do ônibus e orientamos o eixo no sentido do

¹ É bom perceber que o fato de ambas as grandezas terem dimensões físicas distintas exige que o termo “área” não seja tomado ao pé da letra, mais ou menos repetindo a situação que encontramos na definição da velocidade: velocidade é a inclinação da reta tangente ao gráfico de $x(t)$, mas não pode ser confundida com a tangente do ângulo dessa reta, embora ambas as grandezas possam ser interpretadas de modo quase idêntico – veja o texto complementar 1.

movimento do veículo. Como ele alcançou $36 \text{ km/h} = 10,0 \text{ m/s}$ e a aceleração era $2,0 \text{ m/s}^2$, o veículo foi acelerado durante um intervalo de tempo de $5,0 \text{ s}$. Por um cálculo semelhante determinamos que a freada, com aceleração $-1,0 \text{ m/s}^2$, durou 10 s . A Figura 2 mostra o gráfico correspondente.




Figura 2. Gráfico do movimento descrito no Exemplo 1. O gráfico da figura da direita é igual ao outro, mas nela estão identificados o instante $t = 30 \text{ s}$ e um instante com $30 < t_f < 40 \text{ s}$

(b) O deslocamento entre as duas paradas corresponde à área sob a curva da velocidade. Desde que a figura forma um trapézio, calculamos essa área como

$$\text{deslocamento} = \frac{15 + 30}{2} \cdot 10 = 225 \text{ m}$$

(c) O veículo de fato passou por um ponto a 200 m do ponto de partida, porque o percurso total foi maior que esse, conforme o cálculo do item (b) acima. Ao invés de determinar a equação horária para qualquer t , que será complicada uma vez que o movimento tem aceleração variável, determinamos um intervalo de tempo curto em que o veículo passa por esse ponto e escrevemos uma equação mais detalhada apenas para esse intervalo. O deslocamento até $t = 30 \text{ s}$, calculado por uma forma análoga à usada no item (b), é

$$\text{deslocamento}(t=0 \text{ até } t=30\text{s}) = \frac{15+20}{2} \cdot 10 = 175 \text{ m} .$$

Juntando com o resultado do item (b), vemos que o veículo está a 200 m do ponto de partida em algum instante compreendido entre $t = 30 \text{ s}$ e $t = 40 \text{ s}$.

Na gráfico à direita na figura 1, demarcamos com linhas tracejadas a região do gráfico cuja área corresponde ao deslocamento entre $t = 30 \text{ s}$ e um certo instante de tempo t_f . O instante de tempo que buscamos corresponde a t_f desde que o deslocamento seja de 25 m (obtido pela diferença entre o ponto determinado pela questão, 200 m , e o deslocamento até $t = 30 \text{ s}$, 175 m). A equação obtida impondo essa condição é

$$25 = \frac{v(30) + v(t_f)}{2} \cdot (t_f - 30) = \frac{10 + 10 - (t_f - 30)}{2} \cdot (t_f - 30),$$

que foi calculada como a da área de um trapézio (que agora está deitado, a altura está na abscissa). Resolvendo essa equação do 2º grau, obtemos $t_f = 32,9 \text{ s} \cong 33 \text{ s}$, que é o instante em que o veículo alcançou um ponto a 200 m do ponto de partida.

Exemplo 2. A figura 3 abaixo representa, aproximadamente, a velocidade de um corredor, que se desloca ao longo de uma pista de corrida em função do tempo.




Figura 3. Gráfico do Exemplo 2.

- Interprete a mudança de sinal de velocidade em $t = 28 \text{ s}$.
- Determine a distância entre o ponto em que estava em $t = 10 \text{ s}$ até o ponto em que chega quando $t = 40 \text{ s}$.
- Determine o instante em que o corredor volta ao mesmo ponto por que passou em $t = 10 \text{ s}$.
- Determine a posição do corredor em $t = 50 \text{ s}$, se em $t = 0$ sua posição era $x = 300 \text{ m}$.
- Determine o percurso total do corredor.

Solução.

a) A mudança de sinal da velocidade sempre indica inversão do sentido do movimento. Parece que a pista de corrida é curta e ele tem que fazer um percurso de ida e volta na pista.

b) O deslocamento é a área sob a curva no intervalo mencionado pelo problema, ou usando o símbolo matemático correspondente,

$$x(40) - x(10) = \int_{10}^{40} v(t') dt'.$$

A velocidade é positiva no início desse intervalo, tornando-se negativa no final. Tanto a parte positiva quanto a negativa têm a forma de trapézios (com dimensão de tempo nas bases e de velocidade, na altura), de maneira que calculamos

$$x(40) - x(10) = \frac{18+16}{2} \cdot 8 - \frac{12+10}{2} \cdot 8 = 48 \text{ m.}$$

Note que tanto faz subtrairmos a área do 2º trapézio como somarmos as parcelas usando um valor negativo para a velocidade no cálculo da parcela relativa ao 2º trapézio. Tudo o que temos a fazer é evitar falar em área negativa, desde que área é uma grandeza definida positiva.

c) Queremos determinar t_f de modo que a área sob a curva no intervalo $10 < t < t_f$ seja nula, ou melhor, que a área do trapézio formado pela curva entre $t = 10$ e $t = 28$ s seja igual à do trapézio formado pela curva entre $t = 28$ e $t = t_f$. Aproveitando a simetria da figura em relação a $t = 28$ s, vemos que, escolhendo $t_f = 46$ s, o trapézio formado pela curva entre $t = 28$ e $t = 46$ s é idêntico ao formado pela curva entre $t = 10$ e $t = 28$ s. A resposta é, portanto,

$$t_f = 46 \text{ s.}$$

Veja que, não fosse a simetria da figura, daria mais trabalho achar a resposta. Precisaríamos dividir a figura em pedaços cujas áreas fossem mais fáceis de calcular, como fizemos no problema anterior.

d) De novo temos que calcular uma integral definida,

$$x(50) - x(0) = \int_0^{50} v(t') dt' \therefore$$

$$x(50) - 300 = \frac{28+22}{2} \cdot 8 - \frac{22+20}{2} \cdot 8 = 32 \text{ m} \therefore x(50) = 300 + 32 = 332 \text{ m.}$$

e) Nesse caso, vamos somente calcular a distância que ele percorre na ida:

$$d(\text{ida}) = \frac{28 + 22}{2} 8 = 200 \text{ m}$$

com a distância percorrida na volta

$$d(\text{volta}) = \frac{28 + 22}{2} 8 = 200 \text{ m}$$

Portanto, o corredor está praticando a corrida dos 200 m, embora parando no ponto inicial, para fazer um problema mais fácil para este texto.

3. Integral indefinida – determinação da posição do corpo por meio da primitiva de $v(t)$

Quando estudamos derivadas, montamos a seguinte tabela:

função	derivada	condição
$f(x) = C$	$\frac{df}{dx} = 0$	C é independente de x
$f(x) = x^n$	$\frac{df}{dx} = nx^{n-1}$	qualquer n para $x > 0$ somente n inteiro para $x < 0$
$f(x) = g(x) + h(x)$	$\frac{df}{dx} = \frac{dg}{dx} + \frac{dh}{dx}$	
$f(x) = Cg(x)$	$\frac{df}{dx} = C \frac{dg}{dx}$	C é independente de x

Agora, entendendo a integração como operação inversa da derivação, ou seja

$$\int f(x)dx = F(x) \Leftrightarrow f(x) = \frac{dF}{dx},$$

podemos montar a seguinte tabela, onde $F(x)$ é chamada de primitiva de $f(x)$ ou antiderivada:

função, $f(x)$	Antiderivada, $F(x) = \int f(x')dx'$	condição
$f(x) = C$	$F(x) = Cx + cte$	C é independente de x
$f(x) = x^n$	$F(x) = \frac{x^{n+1}}{n+1} + cte$	qualquer $n \neq -1$ para $x > 0$; somente n inteiro e $n \neq -1$ p/ $x < 0$
$f(x) = g(x) + h(x)$	$F(x) = G(x) + H(x)$	G e H , integrais de g e h
$f(x) = Cg(x)$	$F(x) = CG(x)$	C é independente de x

Esta tabela é obtida a partir da anterior permutando as colunas e, eventualmente, redefinindo as constantes que aparecem nas fórmulas.

A partir da primitiva, podemos calcular qualquer integral definida, ou seja, a área (ou menos um vezes a área) entre o gráfico da função e o eixo Ox num intervalo $[a,b]$ dado, por

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a).$$


Note que a constante que sempre aparece na primitiva não importa neste cálculo, porque a integral definida é uma diferença da primitiva para dois valores distintos de x , ou seja, a constante é somada e subtraída no membro direito da equação acima, não dando qualquer contribuição para a integral.

Os exemplos 1 a 3 abaixo ilustram este método, usando as primitivas das potências inteiras de x .

Exemplo 1. Quando temos uma função do 2º grau,

$y = a + bx + cx^2$, a primitiva é $F(x) = \int (a + bx + cx^2) dx$, que, usando a regra de que a primitiva da soma é uma soma de primitivas, leva a

$$F(x) = \int a dx + \int bx dx + \int cx^2 dx.$$



Usando que a primitiva de uma constante multiplicada por uma função é a constante multiplicada pela primitiva da função, temos $F(x) = ax + C' + b \left(\frac{x^2}{2} + C'' \right) + c \left(\frac{x^3}{3} + C''' \right)$.

Agora, reunindo as constantes todas numa só (afinal, a soma de constantes é uma constante), obtemos finalmente

$$F(x) = ax + b \frac{x^2}{2} + c \frac{x^3}{3} + C .$$

Assim, para calcular a área sob a parábola $y = 90 - 30x + 3x^2$ da figura ao lado entre $x = 0$ e $x = 10$, precisamos da primitiva, que é $F(x) = 90x - 15x^2 + x^3 + C$, e a área entre $x = 0$ e $x = 10$ é, simplesmente, $A = F(10) - F(0) = 90 \cdot 10 - 15 \cdot 100 + 1000 + C - C = 400$, um valor que é pouco menos da metade do retângulo de altura 90 e base 10, determinado pelos extremos da figura.

Note que poderíamos ter escolhido $C = 0$, porque, como estamos calculando uma diferença, o valor dessa constante acaba não entrando no cálculo.

A primitiva para o polinômio do 1º grau, $y = a + bx$, pode ser obtida do resultado acima, substituindo $c = 0$. Neste caso, porém, as figuras formadas pela curva com o eixo Ox são triângulos, retângulos e trapézios, cujas áreas podem ser calculadas facilmente, dispensando o uso da primitiva.