Ribeirão Preto, 03 de abril de 2023.


Prezadas (os) colegas,

Recentemente uma solicitação feita á Central de Informática e Análises (CIA) foi atendida, o que modificou o formulário utilizado por nós, motivo pelo qual encaminhamos essa orientação.

Ao final do atendimento do nutricionista, aparece atualmente o campo "incluir diagnóstico". Esse campo necessita de ser preenchido conforme dados obtidos na nossa avaliação nutricional.



Ao final, ele deve receber o CID (código internacional de doenças) a classificação correspondente. Clicando em adicionar diagnóstico, você será direcionado (a) para a tela:



Você deverá proceder com a inclusão do CID (deixamos alguns ao final do documento, para facilitar); caso não tenha o código, você deve fazer a busca no campo "descrição". Quando localizado o CID, a descrição vai aparecer e você deve confirmar, clicando na caixinha abaixo:



Após a confirmação, ele constará na evolução, da seguinte forma:



No "tipo de diagnóstico" marcar como secundário, pois ficará registrado com as demais condições do paciente.



Principais CIDs na área da nutrição:

E40 Kwashiorkor

- Desnutrição grave com edema nutricional e despigmentação da pele e cabelo. Exclui: kwashiorkor marasmático.

E41 Marasmo Nutricional

- Desnutrição grave com marasmo. Exclui: kwashiorkor marasmático

E42 Kwashiorokor marasmático

- Desnutrição proteico-energética grave: tanto de kwashiorkor quanto de marasmo (forma intermediária)

E43 Desnutrição proteico -calórica grave não especificada

- Perda de peso grave em crianças ou adultos, ou falta de ganho de peso em crianças conduzindo a um peso que está, pelo menos 3 desvios-padrão abaixo da média para a população de referência (ou uma perda similar expressa por outras abordagens estatísticas). Quando somente uma medida é disponível, há uma alta probabilidade de desnutrição protéico- calórica grave quando o peso observado for de 3 ou mais desvios-padrão abaixo do valor esperado para uma população de referência.

E44 Desnutrição proteico-calórica de graus moderado e leve E44.0 Desnutrição protéico-calórica moderada

- Perda de peso, em crianças ou adultos, ou falta de ganho de peso em crianças, conduzindo a um peso observado de 2 ou mais, mas menos do que 3, desvios-padrão abaixo da média para uma população de referência (ou uma perda similar expressa através de outras abordagens estatísticas). Quando se dispõe somente de uma medida de peso, há uma alta probabilidade de desnutrição protéico-calórica moderada quando o peso observado é de 2 e de menos do que 3 desvios-padrão abaixo da média de uma população de referência.

E44.1 Desnutrição protéico-calórica leve

- Perda de peso em crianças e adultos, ou falta de ganho de peso em crianças, conduzindo a um peso que é de 1 ou mais, mas menos do que 2 desvios-padrão abaixo da média para uma população de referência (ou uma perda similar expressa através de outras abordagens estatísticas). Quando se dispõe somente de uma medida de peso, há uma alta probabilidade de desnutrição protéico-calórica leve quando o peso observado for maior do que 1 e menor do que 2 desvios-padrão abaixo da média da distribuição de uma população de referência.

E45 Atraso no desenvolvimento devido à desnutrição proteico-calórica

- Estatura baixa nutricional.
- Raquitismo.
- Retardo físico devido à desnutrição.

E46 Desnutrição proteico- calórica não especificada

- Deseguilíbrio proteico-energético. - Desnutrição.

E65 Adiposidade localizada

- Coxim gorduroso.

E66 Obesidade

E66.0 Obesidade devida excesso de calorias

E66.1 Obesidade induzida por drogas

E66.2 Obesidade extrema com hipoventilação alveolar (Síndrome de PickWick)

E66.8 Outra obesidade (obesidade mórbida)

E66.9 Obesidade não especificada (obesidade simples)

Z71.3 Aconselhamento e supervisão dietéticos (alergias e intolerâncias alimentares, colite, diabetes mellitus, gastrite, dislipidemias, obesidade, etc.;)

Z76.3 Pessoa em boa saúde acompanhando pessoa doente (Acompanhante de paciente)