


adesivo



- aplicado na face externa e superior do braço ou aplicado acima da linha dos pelos púbicos
- combinação entre etinilestradiol + norelgestromina
- atuam inibindo a estimulação do ovário, não permitindo a ovulação
- utilização: 1x por semana (7 dias) durante 3x ao mês

folha de revestimento impermeável matriz ou reservatório da substância ativa adesivo folha de plástico



- fácil aplicação/uso
- não impede a relação sexual
- não exige um cuidado diário de lembrar de tomar comprimido

- estética: pode ser visto pelas pessoas
- caro se comparado a pílula
- pode causar irritações na pele
- em pessoas acima do peso a gordura excessiva pode prejudicar a absorção dos hormônios
- preciso ter cuidado na frequência de banhos turcos ou com a aplicação de cremes na pele para que ele não se descole

irritação na pele

sangramento vaginal

cólicas

nervosismo

dor nos seios

aumento das infecções vaginais

manchas escuras na pele

vômito

depressão

tontura

dor abdominal

enjoo

retenção de líquidos

queda de cabelo

aumento de pressão arterial

- mulheres com insuficiência hepática
- pós-menopausa
- com risco de tromboembolismo venoso ou arterial,
- com histórico de enxaqueca e/ ou que possuem hipersensibilidade aos princípios ativos de alguns dos componentes do adesivo
- deve ser evitado por mulheres que possuem suspeita de câncer de mama ou de endométrio

anel vaginal/nuvaring



- anel de silicone flexível com cerca de 5 cm
- inserido na vagina uma vez ao mês e retirado após 3 semanas
- pausa de uma semana para a menstruação
- impede ovulação e gestação através da liberação gradual de hormônios progestágenos e estrógenos

- não interfere na relação sexual e não é desconfortável
- colocado somente uma vez ao mês
- ajuda a regular o ciclo e reduzir dores menstruais e fluxo
- permite esquecimento de até 3 horas para substituição do anel
- existe um serviço gratuito de alertas via SMS para lembrar o dia de aplicar e retirar o anel, diminuindo o risco de esquecimento.

- não protege contra DSTs
- impotante introduzir o anel no mesmo horário para não prejudicar efeito
- pode sair durante relações sexuais
- receio da mulher em saber aplicá-lo
- proibido seu uso em pessoas com problemas no fígado ou pressão alta

náuseas

infecções vaginais frequentes

aumento de peso

dor de cabeça

risco maior de surgirem problemas como pressão arterial alta, infecção urinária, retenção de líquidos e formação de coágulos

dor abdominal

enxaqueca

períodos menstruais dolorosos

diminuição do desejo sexual

- mulheres que têm doenças que afetam a coagulação do sangue
- acamadas devido a alguma cirurgia
- tenham sofrido um infarto ou AVC
- sofram de angina de peito
- tenham diabetes grave, pressão alta, colesterol elevado
- algum tipo de enxaqueca, pancreatite, doenças no fígado, tumor no fígado, câncer de mama, hemorragia vaginal sem causa ou alergia ao etinilestradiol ou ao etonogestrel

implante subdérmico/implanon



- chip anticoncepcional
- bastão com cerca de 2 mm de diâmetro por 4 cm de comprimento
- hormônio derivado da progesterona o etonogestrel
- bloqueia a ação dos ovários
- duração de 3 anos



- 1) Índice de falha de 0,05%
- 2) Duração de 3 anos
- 3) Impede a menstruação
- 4) Ameniza os hormônios da pré menstruação

- 1) Duração de 3 anos
- 2) Aumento da retenção
- 3) Amenorréia
- 4) Sem proteção contra as ISTs
- 5) Alto custo

manchas na pele

diminuição do desejo sexual

náuseas

variações de humor

dor de cabeça

acne

cistos nos ovários

- Presença ou histórico de doenças hepáticas graves
- Sangramento vaginal não diagnosticado
- Presença ou suspeita de sensibilidade a esteroide sexual
- Gravidez ou suspeita de gravidez

injeção mensal/trimestral



- injeção hormonal sexual feminina que possui um estrogênio e progestogênio, no caso da mensal e um progestogênio no caso da trimestral.
- cyclofemina, mesigyna ou perlutan (mensal); Depo Provera e a Contracep (trimestral)
- agem inibindo a ovulação e aumentando a viscosidade do muco cervical, dificultando a passagem dos espermatozoides
- aplicada por um profissional da saúde todos os meses (mensal) ou a cada três meses (trimestral), na região dos glúteos, braço ou quadril

- elimina o risco de esquecimento
- promove a diminuição do fluxo menstrual
- combate os sintomas da TPM
- diminui o risco de câncer de endométrio, de ovário e de doença inflamatória pélvica
- pode ser utilizado para ajudar a controlar os sintomas de endometriose
- Não afeta a fertilidade (mensal)

- a sua ação não só pode ser interrompida como pode prolongar-se para além dos 3 meses (até 12 meses), não permitindo retomar de imediato a capacidade reprodutiva quando desejada (apenas trimestral)
- ciclo menstrual irregular e amenorreia (ausência de menstruação)

nervosismo

dor abdominal

dor de cabeça

aumento do peso

depressão

diminuição do desejo sexual

queda de cabelo

náuseas

corrimento vaginal

acne

aumento da sensibilidade mamária retenção de líquidos

- Gravidez ou suspeita de gravidez
- Hipersensibilidade conhecida ao acetato de medroxiprogesterona ou a qualquer componente da fórmula
- Sangramento vaginal de causa não diagnosticada
- Suspeita ou confirmação de câncer de mama
- Alterações graves da função do fígado
- Tromboflebite ativa ou história atual ou pregressa de distúrbios tromboembólicos ou cerebrovasculares
- Histórico de aborto retido

DISPONIBILIDADE SUS = REDE PRIVADA

and the state of t

Referências

- https://melhorcomsaude.com.br/adesivos-transdermicos-caracteristicas-e-usos/
- https://www.tuasaude.com/adesivoanticoncepcional/#:~:text=Os%20efeitos%20do%20adesivo%20transd%C3%A9rmico,e% 20aumento%20das%20infec%C3%A7%C3%B5es%20vaginais
- https://www.tuasaude.com/anel-vaginal/
- https://www.msdmanuals.com/pt-br/profissional/ginecologia-e-obstetr%C3%ADcia/planejamento-familiar/implantes-contraceptivos-subd%C3%A9rmicos
- https://clinifemina.com.br/implanon-chip-anticoncepcional/
- https://www.tuasaude.com/implante-anticoncepcional/
- https://www.tuasaude.com/anticoncepcional-injetavel-mensal/
- https://www.tuasaude.com/metodo-contraceptivo-injetavel/