



UC 230 1909 : Características gerais do reparo Tecidual no sistema estomatognático

Tipos de Feridas



Feridas

Solução de continuidade de um tecido vivo



Ferida de exodontia


- Após a remoção (avulsão ou extração) de um dente
- Reparo mucosa alveolar e do alvéolo



Fratura

(Tipo de "ferida" em tecido ósseo)

- Ruptura do tecido ósseo



Profa. Natacha – Hospital Municipal do Jabaquara



FERIDAS

- **Pelo tipo de agente que gerou a ferida**
 - Incisa
 - Contusa
 - Lacerante
 - Perfurante
 - **Pelo grau de contaminação**
 - Limpa
 - Contaminada
 - Infectada
-

Ferida incisa



Acervo Dra. Lais Albuquerque – Hospital
Universitário da Universidade Estadual de
Londrina

Ferida lacerante




Bordas mal definidas
: mordedura
: arrancamento



Ferimentos perfurante – arma de fogo



Ferida limpa




Ferimento Corto-contuso – Fragmento do para-brisa automóvel




Ferida contaminada





Ferida infectada



Reparo Tecidual

- Mecanismo complexo que envolve a capacidade do organismo vivo em recompor as estruturas lesadas ou perdidas após uma agressão.
- agentes físicos (ex. traumas, cirurgias, queimaduras),
- químicos (ex. ação de substâncias químicas),
- biológicos (microrganismos) e imunológicos (ex. reações autoimunes)

Cirurgia




Reparo

- A terapêutica cirúrgica é baseada na premissa de que os tecidos vivos são capazes de restituir, total ou parcialmente, sua forma e função.

Reparo de ferida mucosa



Fase inflamatória



Fase proliferativa



Remoção da sutura

Diminuem: edema, rubor, calor e dor

Granulação do tecido:
Aspecto morulado, ligeiramente
avermelhado

Ferida diminui de tamanho - contração

Traçado incisional não perceptível

REPARO



Reparo tecidual

Fase de remodelamento ou maturação



Pós-operatório 7 dias



Pós-operatório 14 dias

Reparo Tecidual



Acervo Dra. Lais Albuquerque – Hospital Universitário da Universidade Estadual de Londrina